



**עלון לצרכן לאקסיבן**

אקסיבן מיועד לבעלי רישיון לשימוש בקנאביס רפואי בלבד

## אקסיבן טיפות למתן תת-לשוני

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>שמן קנביס רפואי</b><br><b>IMC-Medical Grade</b><br><b>T15/C3</b> | <b>שמן קנביס רפואי</b><br><b>IMC-Medical Grade</b><br><b>T10/C2</b> | <b>שמן קנביס רפואי</b><br><b>IMC-Medical Grade</b><br><b>T10/C10</b> |
| <b>שמן קנביס רפואי</b><br><b>IMC-Medical Grade</b><br><b>T5/C10</b> | <b>שמן קנביס רפואי</b><br><b>IMC-Medical Grade</b><br><b>T3/C15</b> | <b>שמן קנביס רפואי</b><br><b>IMC-Medical Grade</b><br><b>T1/C20</b>  |

אקסיבן הינו מיצוי מלא של תפרחות קנאביס רפואי מהול בשמן MCT (שעשוי משמן קוקוס/גרעיני דקל). טיפות אקסיבן מיועדות למתן תת-לשוני.

**החומר הפעיל:** התפרחת של הקנאביס מכילה קנאבינואידים שונים, והמשמעותיים מביניהם הינם Tetrahydrocannabinol (THC) ו-Cannabidiol (CBD).
ל כל בבקובון מכיל מיצוי מהול בשמן בכמות כוללת של 10 גרם.

**אקסיבן זמין ב-6 חוקים שונים שמכילים ריכוזים שונים של 2 המרכיבים הללו:**

| שמן קנביס רפואי<br>IMC – Medical Grade<br><b>T15/C3</b> | שמן קנביס רפואי<br>IMC – Medical Grade<br><b>T10/C2</b> | שמן קנביס רפואי<br>IMC – Medical Grade<br><b>T5/C10</b> | שמן קנביס רפואי<br>IMC – Medical Grade<br><b>T10/C10</b> | שמן קנביס רפואי<br>IMC – Medical Grade<br><b>T10/C2</b> | שמן קנביס רפואי<br>IMC – Medical Grade<br><b>T1/C20</b> |
|---|---|---|--|---|---|
| עשיר ב-THC  | עשיר ב-THC  | עשיר ב-CBD  | מאוזן  | עשיר ב-THC  | עשיר ב-CBD  |
| E.P* 6  | E.P* 4  | E.P* 5  | E.P* 6.5   | E.P* 5.5  | E.P* 7  |
| THC-15%<br>CBD-3%<br>**CBN < 1.5%                       | THC 10%<br>CBD 2%<br>**CBN<1.5%                         | THC 5%<br>CBD 10%<br>**CBN<1.5%                         | THC 10%<br>CBD 10%<br>**CBN<1.5%                         | THC 3%<br>CBD 15%<br>**CBN<1.5%                         | THC 1%<br>CBD 20%<br>**CBN<1.5%                         |
| כל טיפה מכילה:<br>4.5mg THC<br>0.9mg CBD                | כל טיפה מכילה:<br>3mg THC<br>0.6mg CBD                  | כל טיפה מכילה:<br>1.5mg THC<br>3mg CBD                  | כל טיפה מכילה:<br>3mg THC<br>3mg CBD                     | כל טיפה מכילה:<br>0.9mg THC<br>4.5mg CBD                | כל טיפה מכילה:<br>0.3mg THC<br>6 mg CBD                 |

E.P (Estimate Potency) – פוטנטיות המוצר הנקבעת ע"פ ריכוזי החומרים הפעילים המשמעותיים (THC ו-CBD).

\*\*Cannabinol (CBN) הינו תוצר פירוק של THC ומעיד על התיישנות המוצר.

המוצרים T15-ו T3/C15 בדרך כלל אינם מיועדים לחולים שמתחילים טיפול בקנאביס רפואי אלא לחולים עם ניסיון קודם בקנאביס רפואי.

לרשימת המרכיבים הנוספים במוצר ראה טעיף 6.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש במוצר.**

עלון זה מכיל מידע מצטיין על המוצר. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הצוות הרפואי.

תמיד יש ליטול את המוצר בהתאם לתנאי הרישיון לקנאביס רפואי שהוענק לך.

מוצר זה מיועד לטיפול במצבך. אל תעביר אותו לאחרים. הוא עלול להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה. בנוסף, השברת המוצר לאחרים עלולה להביא לאיבוד הרישיון ונחשבת כעבירה פלילית.

### 1. למה מיועד המוצר?

קנאביס רפואי מיועד למחלות שונות כפי שהוגדר ע"י היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. מיקומו של הקנאביס הרפואי בטיפול ברוב המקרים הוא לאחר מיצוי של הטיפולים המקובלים.

### 2. לפני השימוש במוצר

**אין להשתמש במוצר אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לקנאביס או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכיל המוצר (לרשימת המרכיבים הנוספים, ראה טעיף 6).
- יש לך או למישהו במשפחה (קרוב מדרגה ראשונה) רקע של סכיזופרניה, פסיכוזה, או מחלה פסיכיאטרית אחרת.
- יש לך רקע של התמכרות או שימוש לרעה בסמים (כולל קנאביס) או אלכוהול.
- אתה סובל ממחלה ביופולרית (אפיזודות של דיכאון ובין לבין אפיזודות של מניה).
- אתה מתחת לגיל 18.
- אתה לא יכול להיות תחת מעקב של צוות הרפואי.
- את בהריון, חושדת שאת בהריון, מתכננת הריון, או אם את מניקה.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש במוצר:**

- קנאביס רפואי על כל צורתיו הוא בעל פוטנציאל לשימוש לרעה. אין לתת את המוצר לאדם אחר. יש לנקוט כל אמצעי זהירות על מנת למנוע הגעת המוצר לאדם שאינו המטופל.
- שימוש ממושך עלול לגרום לתלות! יש להוועץ ברופא אם אתה חש שאתה מפתח תלות או התמכרות למוצר.
- יש לספר לרופא אם אתה זקוק למנות הולכות וגדלות של המוצר על מנת להקל על הסימפטומים שלך (סבלות).
- אם אתה עומד לעבור ניתוח כלשהו (כולל ניתוח דנטלי) או כל פעולה הכרוכה בהרדמה, או אם אתה עומד לעשות בדיקות מעבדה בעת השימוש במוצר, יש לדווח לרופא על נטילת מוצר זה.

- אם אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת המוצר.
- קנאביס רפואי מתאים לחולים שיכולים להתמיד בהוראת הצוות הרפואי לאורך זמן.

**לפני הטיפול במוצר ספר לרופא אם:**

- אתה בגיל 18-25 שנים.
- אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הכבד, הכליות, הלב או כלי דם (כגון בעיה בקצב הלב), המערכת החיסונית (כגון מושתלים או חולים שעוברים כימותרפיה).
- אתה סובל או סבלת בעבר מדיכאון או חרדה.
- אתה סובל מלחץ דם גבוה, לחץ דם נמוך או סוכרת.
- יש לך רקע של התמכרות לטבק או לתרופה כלשהי (כגון אופיואיד או בנודויאזפין).

**תגובות בין תרופתיות:**

**אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח טרם השימוש במוצר!**

במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח את התרופות הבאות (יש לציין כי הרשימה שלהלן מציינת את החומרים הפעילים בתרופות. אם אינך בטוח האם אתה משתמש באחת מהתרופות הללו אנא התייעץ עם הרופא או הרוקח):

- תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית כגון: תרופות לנאב (כגון משככי כאבים אופיואידים), תרופות להרגעה, לשינה, או תרופות נוגדות חרדה (כגון בנודויאזפנים), תרופות אנטיהיסטימיניות (כנגד אלרגיה), תרופות לטיפול בהפרעות נפשיות כמו סכיזופרניה (פנטויאזינים, תרופות נורולפטיות). שילוב מוצר זה עם אלכוהול מגביר את הסיכון באופן מיוחד לתאונות דרכים ותאונות אחרות.
- תרופות להרפיית שרירים (כגון בקלופן או בנודויאזפנים).
- תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה או לטיפול בסוכרת.
- תרופות בעלות פעילות אנטיכולינרגית (כגון אנטיהיסטימינים לאלרגיה, טריציקליים לטיפול בדיכאון) .
- תרופות נגד פטריות (כגון: קטוקונאזול, ורוקונאזול, איטרקונאזול, פלוקונאזול) .
- אנטיביוטיקה מקבוצת המקרולידיים (כגון אריתרומיצין, קלריטרומיצין), מטרונידול או סולפאמתוקאזול.
- תרופות לטיפול בשחפת (כגון ריפאמפיצין, ריפאבוטין, איזוניאיד).
- תרופות נגד נגיף ה-HIV או כנגד צהבת סמוג C, מקבוצת מעכבי פרטיאז או non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors.
- תרופות לטיפול באפילפסיה (כגון קלובזאם, טופיראמיט, קרבמזפין, אוקסקרבזפין, פניטואין, נונוברביטאל, פרמידון, חומצה ורפואית, רופינאמיד).
- צמח ההפיריקום (נקרא גם St. John’s Wort).
- וורפרין (קומדיון) – יש לנטר INR.
- ציקלוספורין, וורפמיל, אמידרון, קלופידוגרל, פלואקסטין ופלווקסאמין, אומפרזול ואסאמפרזול.
- ייתכנו תגובות בין תרופתיות נוספות ולכן חשוב ליידע את הרופא או הרוקח על כל תרופה שאתה לוקח!**
- אם אתה נוטל תרופה כלשהי, אין להפסיק או לשנות את המינון שלה בלי להיוועץ עם הרופא!**

**שימוש במוצר ומזון:**

עדיף לא ליטול את המוצר על בטן ריקה, על מנת להקטין את הסיכון ליירדה ברמת הסוכר בדם.

יש להכות כ-15 דקות לאחר נטילת המוצר לפני שאוכלים או שותים.

מומלץ ליטול מוצר זה באותו אופן בכל פעם בהקשר לארוחות כדי שמידת הספיגה של המוצר תהיה דומה בכל שימוש.

מומלץ להימנע משתיית מיץ אשכוליות בזמן הטיפול במוצר.

**שימוש במוצר וצריכת אלכוהול:**

**אין לשתות יינות** או משקאות חריפים בתקופת הטיפול במוצר זה.

שתיית אלכוהול בזמן השימוש במוצר עלולה לגרום לך להרגיש ישננו או להגביר את הסיכון לתופעות לוואי אחרות כגון סחרחורת, ליקויים בקואורדינציה, שינוי משקל, זמן תגובה ושיפוט, ועל כן להגביר את הסיכון לתאונות ולנפילות.

**הריון והנקה:**

אין להשתמש במוצר אם את בהריון או מניקה.
על נשים ו**גברים** להשתמש באמצעי מניעה יעילים במשך כל תקופת הטיפול ועד ל-3 חודשים לאחר הפסקת השימוש בקנאביס.
גברים ייתכן פגיעה באיכות או בכמות הזרע.
חלק ממרכיבי הקנאביס עוברים בחלב האם.

**שימוש בילדים:**

מוצר זה אינו מיועד לילדים ומתגברים מתחת לגיל 18 שנים.

**נהיגה ושימוש במכוונת:**

השימוש במוצר זה עלול לפגום בערנות ולגרום לנמנום, סחרחורת ולמספר תופעות לוואי נוספות (כגון ירידה בריכוז, ליקוי

בקואורדינציה, והאטה בזמן תגובה) שעלולות לפגוע ביכולתך לנהוג /או להפעיל מכוונת כבדות/מכוונת ולהגביר את הסיכון לתאונות.

פקודת התעבורה (סעיף 64b) ותקנות התעבורה (סמים שאינם נחשבים סמים מסוכנים התשע"ח) קובעים באילו מקרים מותר או אסור

לנהוג בעת השימוש בקנאביס רפואי, ותמיד יש לפעול על פיהן.

**שימוש בקשישים:**

קשישים ותשושים עלולים להיות יותר רגישים לתופעות הלוואי של המוצר כגון נמנום וסחרחורת ועל כן, כדרשת זהירות רבה כנגד נפילות ותאונות אחרות העלולות להתרחש (כגון בעת הנחת אוכל הם).
עד להסתגלות למוצר, רצוי להימנע ממעבר פתאומי מצבב/שיבה לעמידה, כדי למנוע סחרחורת. השימוש במוצר דורש זהירות יתר עבור קשישים עם מגבלות בתפקוד שגרים לבד.

### 3 . כיצד תשתמש במוצר?

תמיד יש להשתמש במוצר לפי הוראות הצוות הרפואי! אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש במוצר היוועץ בצוות הרפואי.

לפני תחילת השימוש בקנאביס רפואי יש לקבוע את יעד הטיפול כגון ירידה משמעותית בכאב או שיפור בתפקודו /או באיכות החיים. בדיקת השגת יעדים אלו או אי-השגתם תשמש לצוות הרפואי כעוד בהערכת התועלת של הטיפול ובהחלטה האם להמשיך בטיפולו והאם להפסיק את הטיפול.

התאמת המינון היומי והחדשי הנה אינדיבידואלית לכל מטופל ותבוצע בתהליך טיטרציה (העלאת המינון באופן הדרגתי), אשר בעזרתו ניתן יהיה להתאים את הכמות היומית המומלצת, במטרה להגיע למינון הנמוך ביותר שמביא תועלת משמעותית עם מינימום תופעות לוואי.

בניית התוכנית הטיפולית במוצרי קנביס תהיה בהתאמה למדרגות הפרוטוקול הטיפוטיבי לשינוי כמות (תלוי הפוטנציאל) של מוצרי הקנביס המופיע בחוברת המידע ומדריך רפואי מאת היחידה לקנביס רפואי (IMC-GCPC). תהליך הטיפוּרציה יהיה מלווה במעקב הצוות הרפואי, אשר ינחה את המטופל בנוגע למינון ולאופן השימוש במוצר, בהתאם למצב המטופל, לתגובתו לטיפול ולתופעות הלוואי. בסוף התהליך ייקבע המינון היומי המיטב.

תהליך הטיפוּרציה יכול לקחת מספר שבועות ולעיתים אף יותר ולכן יש להתאזר בסבלנות!

אם בהמשך יהיה שינוי במצב בריאותך או בתגובתך לטיפול, ייתכן ויהיה צורך לעשות טיטרציה מחדש.

הערה: אם לא מצליחים להגיע למינון מתאים לאחר תהליך הטיפוּרציה, ניתן לדון עם הצוות הרפואי לגבי האפשרות למעבר לריכוז THC/CBD אחר, למוצר אחר, או לצורת מתן אחרת. במידת הצורך ניתן גם לשלב טיפול עם 2 מוצרים בעלי ריכוזים שונים של THC/CBD (לדוגמה: מוצר אחד ליום והשני ללילה).

לאורך כל תקופת הטיפול במוצר מדרש מעקב על ידי הצוות הרפואי. המעקב יהיה יותר תכופ בתחילת הטיפול ולאחר שלוש שבועות.

#### אופן השימוש:

כ-5 דקות לפני השימוש יש לאכול או לשתות משהו מתוק (לא דיאטיטי) כמו פרי או מיץ פירות כדי לנטוע נפילה ברמת הסוכר בדם. (חולי סוכרת: יש להתייעץ עם הרופא המטפל באשר לצורך באכילת דבר מתוק וגם בצורך בהתאמת מינון של תרופות לסוכרת).

יש לפתוח את מכסה הבקבוקון ולהפוך אותו במהירות למצב אנכי לגמרי (ולא בזווית/בלטסון) מעל כפית. יש לספסף את מספר הטיפות הנדרש (בהתאם למינון) לתוך

הכפית, ולאחר מכן להפוך חזרה במהירות את הבקבוקון.


הערה: אם הצוות הרפואי הורה על מספר טיפות בנטיילה אחת, יש לספור במדויק את הטיפות לתוך הכפית.

יש להכניס את הכפית לפה מתחת ללשון ולהוציא את הכפית מהפה באיטיות תוך כדי "מריחה" כנגד הצד התחתון של הלשון, כך שהשמן יישאר מתחת ללשון והכפית תצא מהפה "נקייה" מהשמן.

לאחר הנטילה מתחת ללשון, יש להמתין דקה לפני בליעת הרוק.

לאחר נטילת השמן יש לסגור היטב את המכסה של הבקבוקון.

הערה: בטפטוף בטהיה אלכסונית של הבקבוקון, עלולות הטיפות היוצאות מהבקבוקון להימרח של שפת הבקבוקון. במקרה כזה יש להפסיק את הטפטוף, לספוג את שאריות השמן משפת הבקבוקון ולהמתין כדקה לפני טפטוף חוזר.



**אין לעבור על המנה המומלצת.** אין לשנות את המינון ללא התייעצות עם הצוות הרפואי.

יש להשתמש במוצר זה בזמנים קצובים, כפי שנקבע על-ידי הצוות הרפואי.

בדרך כלל נטילים את המוצר 3-4 פעמים ביום (מקסימום עד 6 פעמים). ייתכן שמספר הטיפות בכל נטילה **לא יהיה אחיד**.

יש לחכות כ-15 דקות לאחר הנטילה לפני שאוכלים או שותים.

שים לב: לטיפות תת-לשוניות אין השפעה מיידית וייתכן שתרגיש השפעה כלשהי רק לאחר שעה או יותר. משך ההשפעה של הטיפול בטיפות תת לשוניות ממושך יותר בהשוואה לשיאפה. בנוסף, טיפות תת-לשוניות מעניקות השפעה קלניית (כגון שיפור בכאב או בתפקוד) רק בשימוש לטווח ארוך. לכן, בתחילת הטיפול ייתכן שהתועלת תורגש רק לאחר כשבועיים או יותר. רצף טיפולי חשוב! יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הצוות הרפואי על מנת להשיג את התועלת המרבית.

#### החזקה ומקום השימוש:

בעת תחילת הטיפול, מומלץ לשהות בבית, באווירה נינוחה, בנוכחות מבוגר אחראי נוסף, ובלי לחץ של זמן.

החזקה ושימוש של המוצר ע"י המטופל מותרת בכל מקום בו לא חל איסור פרטני. זאת, בתנאי שהמטופל נושא את הרישיון יחד עימו והמוצר נמצא באריזה המקורית

בכמות שלא תעלה על אריזה אחת או על הכמות החדושה לפי המאשרת לפי הרישיון (הנמוכה מבין השניים).

חל איסור להשתמש במוצר באזורי מכס (כגון שדה תעופה או נמל) ואין להשתמש בנוכחות קטינים.

חל איסור לשאת את המוצר לחו"ל.

בעת אשפוז, ניתן להשתמש במוצר רק לאחר קבלת אישור מהצוות הרפואי בבית החולים, ובהתאם להוראות המצוות לגבי מקום השימוש ותנאי האחזקה של המוצר.

#### אם שכחת ליטול את המוצר:

אם שכחת ליטול מוצר זה בזמן הקצוב יש ליטול מנה מיד כשזכרתך, אך יש להקפיד שיהיה הפרש של לא פחות מארבע שעות בין מנה למנה. אין ליטול מנה כפולה, כדי לפצות על המנה שנשכחתי!

#### כללי:

אין ליטול מוצר זה בחושיך! בודק התוויית והמנה **בכל פעם** שאתה נוטל את המוצר. הרכב משפיקים אם אתה זקוק להם.

#### הפסקת השימוש:

אין להפסיק ליטול מוצר זה בצורה פתאומית, אלא אם הרופא הורה זאת. אם אתה רוצה להפסיק את נטילת המוצר, יש להיוועץ ברופא **קודם לכן**, שינחה אותך כיצד לעשות

זאת. הרופא בדרך כלל ימליץ לך להפיק את השימוש במוצר בהדרגה על מנת להפחית את הסיכון להופעת תסמיני גמילה כגון: אי שקט, עצבנות או סף גירוי נמוך (עד כדי התפרצות זעם), חרדה, דיכאון, נדודי שינה או חיסוים, קושי בריכוז, שינויים בתיאבון, כאבי בטן, הזעה, צמרמורת, רעד, נמיהה לקנאביס. אם הפסקת את השימוש במוצר באופן זמני, רצוי להיוועץ עם הצוות הרפואי באשר לצורך בהתאמת המינון לפני שאתה מתחיל את הטיפול מחדש.

### 4. תופעות לוואי

בדומה לתרופות, השימוש במוצר זה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אם תופעות הלוואי אינן חולפות או שהן מטרידות או מחמירות, יש להתייעץ עם הצוות הרפואי. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבל מאף אחת מהן.

*תופעות הלוואי השכיחות ביותר:*

- ישנוניות, עייפות או נמנום; סחרחורת קלה עד בינונית - ניתן לשכב עד שההרגשה חולפת. הנמנום והסחרחורת לרוב מופיעים בעת תחילת הטיפול או בהעלאת המינון, ובדרך כלל חולפים לאחר הסתגלות הגוף למוצר. ייתכן שבתחילת הטיפול יהיה צורך ביותר שעות שינה.
- ירידה ברמות הסוכר בדם, ירידה בלחץ הדם, דופק מואץ או דפיקות לב חזקות. כדי למנוע את הירידה ברמות הסוכר בדם יש לאכול או לשתות דבר מתוק (כגון פרי או מיץ פירות) כ-5 דקות לפני נטילת הטיפות. במקרה של ירידה בלחץ הדם ניתן לאכול משהו מלוח או לשתות משקה עם קאפיין. בחולים שנטלים תרופות נגד לחץ דם או סוכרת, ייתכן והרופא יתאים את המינון של התרופות הללו.

#### תופעות לוואי נוספות:

הגברת תיאבון (במיוחד כמיהה לפחמימות), יובש או אדמומיות בעיניים, שטטשו ראייה, יובש בפה, עייפות, כאב ראש, כאב בטן, דופק איטי, חוסר יציבות או ליקוי בקואורדינציה מוטורית; שינויים קוגניטיביים כגון איבוד זיכרונות בטווח הקצר, פגיעה בקו מחשבה רצוף ושינויים בתפיסת הזמן הממרחב, פגיעה בריכוז או בשקילת הדעת, וכן אופוריה high בלשון (לדבור), הרגשת "כבדות" או ריחוף, תחושת רוגע או תחושת חידוד של החושים.

בדרך כלל התופעות הללו פוחתות עם הזמן לאחר שהגוף מסתגל למוצר.

ייתכנו בחילות אם המינון גבוה מדי או אם נטילים את המוצר על בטן ריקה.

ייתכנו תגובות מקומיות בחלל הפה.

##### *תופעות לוואי בשימוש לטווח ארוך:*

מתוארות בספרות תופעות לוואי פוטנציאליות נוספות אשר עלולות להתפתח לאחר שימוש ארוך טווח (כגון פגיעה ביכולת הקוגניטיבית, התפתחות או החמרה של סכיזופרניה/פסיכוזה). כמו כן, תוארו בספרות התמכרות ושימוש לרעה בקנאביס. תופעות אלו נקשרות בעיקר לשימוש כרוני, לא-רפואי, בצורת מתן של עישון, ובמיוחד כאשר השימוש החל בגיל ההתגברות או באוכלוסיות מיוחדות בעלות-סיכון גבוה. ניתן להתייעץ עם הצוות הרפואי לגבי הסיכון בתופעות הלוואי לטווח-ארוך.

מינון עודף עלול לגרום לישנוניות או סחרחורת חזקה או שטטשו, לשינויים משמעותית בלחץ הדם, בדופק, בקצב הנשימה או ברמות הסוכר בדם שיכולים להוביל לסחרחורת חזקה, בחילות/הקאות, הזעה, רעד, חולשה, דופק או קצב לב מהיר, ואף לעלפון. במידת האפשר יש לאכול בהקדם משהו מתוק ולשכב. יש לעדכן את צוות הרפואי שינחה לגבי התאמת המינון להבא.

**יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון בבית חולים אם מופיעות תופעות הלוואי הבאות:**

- תגובה אלרגית
- בלבול, התקף פאניקה, חרדה חזקה, תגובה פסיכוטית (כגון הזיות, פרנויה או אשליות שואו)
- תופעות אלו בדרך כלל מחייבות הפסקת הטיפול במוצר

בכל מקרה שבו אתה מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי לרעה בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הצוות הרפואי מיד!

**אם נטלת בטעות מינון יתר** או אם בטעות בלע את המוצר ילד או כל אדם אחר, יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים ולהביא את אריזת המוצר. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

### 5 . איך לאחסן את המוצר?

מנע הרעלה! יש לשמור מוצר זה במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

כאשר אינך זקוק עוד למוצר התייעץ עם הרוחק לגבי אופן סילוקו.

אין להשתמש במוצר אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. ניתן להשתמש במוצר עד 4 שבועות מיום פתיחת הבקבוקון לראשונה, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה המוטבע על-גבי האריזה.

תנאי אחסון: יש לאחסן במקום קריר, יבש ומוגן מאור, מתחת לטמפרטורה של 25°C.

### 6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל, אקסיגני מכיל גם את החומרים הבאים:** שמן medium chain triglycerides = MCT (מורכב משמן קוקוס/שמן גרעיני דקל), ויטמין E.

- כיצד נראה המוצר ומה תוכן האריזה?**

לבקבוקון המכיל 10 גרם מוצר. לבקבוקון פיה של טפטפת לצורך מדידת מספר הטיפות שיש ליטול.

אין להשתמש במוצר במידה ובעת קבלת המוצר קיימת עדות לפתיחה ראשונית או קיים נזק לאריזה החיצונית.

**יצרן:** פנאקסיה תעשיות פרמצבטיית בע"מ, בת-שבע 1, לוד 7116002

**משוק:** מעבדות רפא בע"מ, ת.ד. 405, ירושלים 9100301

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות באפריל 2018.

לשם הפשטות והקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר, אך המוצר מיועד לשני המינים.